



**PERIKSAKAN DIRI
KE PUSKESMAS
DAN DAPATKAN
INFORMASI LEBIH
LANJUT MENGENAI
PENGobatan TBC
KEBAL OBAT**




**Jika pernah berobat
TBC dan sekarang
kembali batuk
berdahak dan demam, apa
yang harus saya lakukan?**



Segera kunjungi puskesmas terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan dahak. Jika terbukti TBC Kebal Obat, pasien akan mendapat obat gratis dan berkualitas!



**YAKIN SUDAH
SEMBUH DARI
TBC?**



**WASPADA
TBC KEBAL OBAT**



Apa itu TBC Kebal Obat?



TBC Kebal Obat adalah TBC yang disebabkan oleh kuman yang sudah kebal obat akibat pasien menghentikan pengobatan TBC sebelum dinyatakan sembuh atau cara pengobatan yang tidak tepat.



Bagaimana pemeriksaannya?



Orang yang diduga sakit TBC kebal obat harus melakukan pemeriksaan dahak dengan alat tes cepat molekular (TCM). Selain itu juga dengan uji kepekaan obat untuk melihat apakah kuman masih peka terhadap obat.



Bagaimana pengobatannya?



Pengobatan TBC kebal obat terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap awal dan tahap lanjutan. Lama pengobatan yaitu 9-11 bulan untuk pengobatan jangka pendek dan 18-24 bulan untuk pengobatan individual. Pemberian pengobatan pada TBC kebal obat dilakukan setiap hari dan melalui pengawasan langsung petugas kesehatan dan Pengawas Menelan Obat (PMO)

PUSKESMAS



Apakah TBC Kebal Obat berbahaya?



Sangat berbahaya! Selain mudah menular, TBC kebal obat lebih sulit diobati dan butuh waktu pengobatan lebih lama, sakit yang dialami pasien akan lebih parah dan bisa mengakibatkan kematian.



Bagaimana gejalanya?



Sama dengan gejala utama TBC biasa yaitu batuk berdahak dengan dibarengi demam, penurunan berat badan, berkeringat malam hari, dan nyeri di dada.



Apa yang akan terjadi jika saya tidak berobat?



Jika tidak diobati, orang dengan kuman TBC kebal obat akan mengalami sakit yang lebih parah hingga mengakibatkan kematian. Pasien juga akan terus-menerus menularkan kuman TBC kebal obat pada orang-orang yang ada di dekatnya seperti anak, pasangan, anggota keluarga lainnya, dan rekan kerja.



Bagaimana caranya saya tahu pengobatannya berhasil?



Anda harus melakukan pemeriksaan dahak setiap 1 (satu) bulan sekali pada Tahap Awal dan 2 (dua bulan) sekali pada Tahap Lanjutan untuk melihat apakah terjadi perubahan kuman dari positif menjadi negatif.

Pasien biasanya akan mengalami perbaikan kondisi tubuh (gejala TBC hilang, nafsu makan kembali normal, berat badan meningkat) sebagai tanda kemajuan pengobatan.